



	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Arbeitsbeginn / nach Arbeitsende. • Vor dem Stellen von Medikamenten. • Nach Toilettenbenutzung. • Bei Bedarf. 	ASEPTOMAN® MED	30 Sekunden	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende
 Fläche	Toiletten, Waschbecken	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. • Bei Bedarf. 	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹
			OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
	Medikamentenschrank	<ul style="list-style-type: none"> • Monatlich. • Direkt bei Kontamination. • Bei Bedarf. 	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹
			OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
	Arbeitsflächen zum Stellen von Medikamenten	<ul style="list-style-type: none"> • Vor dem Stellen von Medikamenten. 	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten			
	Dosetten und Medikamentenkörbe	<ul style="list-style-type: none"> • Monatlich. • Bei Bedarf. 	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
			OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsplan Ambulante Pflege Zentrale

Fläche



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Pflegerucksack / Pflegetasche innen	<ul style="list-style-type: none"> • Monatlich. • Direkt bei Kontamination. • Bei Bedarf. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² <hr/> OPTISAL® N <hr/>	3 Minuten 5 Minuten <hr/> 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten <hr/>	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹ <hr/> <hr/>
Empfindliche Oberflächen z. B. Handys, Monitore, Tastaturen	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich. • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) <hr/>	3 Minuten <hr/>	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹ <hr/> <hr/>
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine Flächen nach Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² <hr/> OPTISAL® N <hr/>	3 Minuten 5 Minuten <hr/> 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten <hr/>	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende ¹ <hr/> <hr/>
Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. • Abfall täglich entsorgen. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² <hr/> OPTISAL® N <hr/>	3 Minuten 5 Minuten <hr/> 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten <hr/>	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Alle Mitarbeitende ¹ <hr/> <hr/>

**Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in
ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC und ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM
eingesetzt werden.**

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.
² Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.
³ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Beim Einsatz von DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.
 Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift