

Desinfektionsplan Bordell

Hände und Haut

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	• Bei Bedarf.	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Schutz	Hautschutz	• Bei Bedarf.	DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM _____		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Pflege	Hände-, Haut- und Körperpflege	• Bei Bedarf.	DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM _____		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Haut einmassieren. Bei der Pflege der Hände insbesondere die kritischen Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Reinigung	Händewaschung	• Vor Arbeitsbeginn. • Nach Arbeitsende. • Nach Toilettenbesuch. • Bei sichtbarer Verschmutzung. • Bei Bedarf.	DESCOLIND COMFORT WASH DESCOLIND PURE WASH _____		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende _____ _____

Desinfektionsplan Bordell

Fläche

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Div. Zubehör, z. B. Dildo, Handschellen, Peitschen	• Nach Gebrauch.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Trinkwasser nachwischen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
Whirlpool, Badewanne, Dusche	• Täglich. • Sofort nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem). • Bei Bedarf.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ¹ _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
Saunabereich (bei versiegelter Oberfläche)	• Täglich. • Sofort nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem). • Bei Bedarf.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ¹ _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
Fußböden	• Sofort nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem).	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ¹ _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Nicht anwenden auf Teppichböden	Alle Mitarbeitende _____ _____
Sanitärbereich: Toilette, Waschbecken, Fußboden	• Täglich. • Sofort nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem). • Bei Bedarf.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ¹ _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____

¹ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Einsatz von DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Die Prüfung des Desinfektionsplans auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift