


# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

## Hände und Haut

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Umgang mit Lebensmitteln.</li> <li>• Nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Körperausscheidungen (z. B. nach dem Windeln, nach der Begleitung von Kindern bei der Toiletten-, Töpfchenbenutzung), auch wenn Schutzhandschuhe getragen wurden.</li> <li>• Vor dem Kontakt mit Wunden (z. B. vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o. ä.).</li> <li>• Nach der Versorgung von Kindern mit Durchfall, Erbrechen oder Atemwegsinfekten.</li> <li>• Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen.</li> <li>• Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich.</li> <li>• Ggf. nach dem Naseputzen.</li> <li>• Ggf. nach dem Toilettenbesuch.</li> <li>• Bei Bedarf (z. B. bei Arbeitsbeginn).</li> </ul>	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 <b>Schutz</b>	<b>Hautschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Arbeitsbeginn.</li> <li>• Vor hautbelastenden Tätigkeiten.</li> <li>• Nach dem Händewaschen.</li> </ul>	DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM _____		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 <b>Pflege</b>	<b>Hände- und Hautpflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Arbeitsende.</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM _____		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 <b>Reinigung</b>	<b>Händewaschung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu Arbeitsbeginn.</li> <li>• Bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. nach dem Spielen mit Sand oder Erde).</li> <li>• Nach der Toilettenbenutzung.</li> <li>• Nach Tierkontakt.</li> <li>• Bei Bedarf (z. B. am Arbeitsende).</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT WASH _____		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmerem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende _____ _____

# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

## Fläche



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
<b>Fieberthermometer</b>	• Direkt nach Gebrauch.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch vollständig abwischen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Spielzeug</b>	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Wickeltischauflage</b>	• Direkt nach Gebrauch.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Toilette, Waschbecken</b>	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Große Flächen z. B. Fußböden, Arbeitsflächen, Sanitärbereich</b>	• Nach Verschmutzung mit (potenziell) infektiösem Material, z. B. mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup> _____  OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten  0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende <sup>1</sup> _____ _____

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

# Desinfektionsplan für Kindereinrichtungen

## Sonstiges

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
<b>Arbeitskleidung</b>	• Sofortiger Wechsel nach Kontamination.	Desinfizierendes Waschverfahren		Maschinelle Aufbereitung bei mind. 65 °C.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Handschuhe</b>	• Bei Desinfektions- und Reinigungsarbeiten.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Chemikalienbeständige Handschuhe</b>	• Beim Umgang mit Konzentraten von Flächendesinfektions-, oder Reinigungsmitteln.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
<b>Unsterile Schutzhandschuhe</b>	• Bei möglichem Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder Ausscheidungen. Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material.	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (geprüft nach DIN EN 455 Teile 1 bis 4)		Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen tragen. Bei Tragezeiten über 10 Minuten möglichst Baumwollhandschuhe unterziehen. Nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen.	Alle Mitarbeitende _____ _____

 Sonstiges

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in **ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC** und **ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM** eingesetzt werden.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Beim Einsatz von DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.**

Bei erforderlicher Wirksamkeit gegenüber unbehüllten Viren – Fläche: ULTRASOL OXY WIPES 5 Minuten. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachbehandelt werden (Ausnahme: DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES)).

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC und ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden.

Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift