

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Vor und nach Patientenkontakt • Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material • Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen • Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung (z.B. Kleidung) 	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel bis zur vollständigen Auftrocknung gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Fläche	Spender f. Desinfektion, Waschlotion, Einmalhandtücher	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 1x monatlich sowie vor Ersetzen des Inhalts • Bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____	Flächen vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen. Pumpsystem gemäß Anleitung desinfizieren. Abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____ _____
	Patientennahe Flächen z.B. Behandlungsliegen/-tisch,-stuhl, Matratzenschutzbezug, Lagerungshilfen	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Patientenwechsel. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____ _____
	Häufige Kontaktflächen z. B. Stühle, Lichtschalter, Handläufe, Türgriffe, Arbeitsflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____ _____

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.



Fläche

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Inventar z. B. Schränke, Ablagen, Spinde, Wandfliesen	<ul style="list-style-type: none"> • Wöchentlich • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Fango	• Sofort nach Gebrauch			Desinfektion: 130°C 15 Min. Haltezeit.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
Rollstühle, Gehwagen nicht personenbezogen	• Sofort nach Nutzung	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Sanitärbereich Waschbecken und Armaturen	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Therapiewanne	• Direkt nach Nutzung.	OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten	Flächen vollständig mit dem Desinfektionsmit- tel benetzen. Abtrocknen lassen. Vor Wieder- verwendung gründlich mit Wasser ausspülen.	Mitarbeitende Pflege ¹ _____ _____

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Fußböden	• Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Bei Desinfektionstüchern kann ein Bodenwischer zur Hilfe genommen werden.	Mitarbeitende Reinigung ¹ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Abfallbehälter, Abfall	• Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzen. Abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
		DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____
		DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Physiotherapeut/innen ¹ _____ _____

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Sonstiges	Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Handschuhe	• Bei Desinfektions- und Reinigungsarbeiten.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Physiotherapeut/innen _____ _____
	Chemikalienbeständige Handschuhe	• Beim Umgang mit Konzentraten von Flächen-, Instrumentendesinfektionsmitteln oder Reinigungsmitteln.	Schutzhandschuhe geprüft nach DIN EN 420 und DIN EN 374		Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Physiotherapeut/innen _____ _____
	Unsterile Schutzhandschuhe	• Vor direktem Kontakt mit Patienten. • Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material. • Bei möglichem Kontakt mit Blut, Sekreten oder Ausscheidungen.	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (geprüft nach DIN EN 455 Teile 1 bis 4)		Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Physiotherapeut/innen _____ _____
	PE-Schürze	• Falls die Arbeitskleidung durchnässt oder kontaminiert werden kann.			Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Physiotherapeut/innen _____ _____
	Schutzkleidung	• Schutzkittel, wenn die Arbeitskleidung kontaminiert oder durchfeuchtet werden kann. • Geeigneter Atemschutz, beim Vorliegen von luftübertragbaren Infektionskrankheiten. • Mund-Nasen-Schutz, z. B. zum Schutz vor der Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen.	Schutzkittel geprüft nach DIN EN 14126 FFP2-Maske geprüft nach DIN EN 149 Mund-Nasen-Schutz geprüft nach DIN EN 14683		Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Physiotherapeut/innen _____ _____

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in **ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC** und **ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM** eingesetzt werden.

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Einsatz von DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachbehandelt werden (Ausnahme: DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES)). Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift