

Desinfektionsplan Toiletten

Hände und Fläche

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	• Vor und nach Toilettenbenutzung.	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende Alle betroffenen Personen _____ _____
 Reinigung	Händewaschung	• Vor Arbeitsbeginn. • Nach Toilettenbesuch. • Bei sichtbarer Verschmutzung.	DESCOLIND PURE WASH _____		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende Alle betroffenen Personen _____ _____
 Fläche	Spender Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse	• Routine mind. 1x wöchentlich. • Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ ¹
	Spender Innenaufbereitung	• Entsprechend den Angaben im Hygienehandbuch.			Herstellangaben beachten.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
	Häufige Kontaktflächen z. B. Lichtschalter, Haltegriffe, Türgriffe, Ablagen	• Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ OPTISAL® N _____	3 Minuten 5 Minuten _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ ¹

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Sanitärbereich: Waschbecken, Armaturen und Toiletten	• Direkt bei Kontamination.	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Fußboden	• Direkt bei Kontamination.	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Abfallbehälter	• Direkt bei Kontamination. • Abfall täglich entsorgen.	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

**Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in
ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC und ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM
eingesetzt werden.**

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

³ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Einsatz von DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift