

Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

Hände, Haut und Fläche

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Arbeitsbeginn. • Nach Arbeitsende. • Vor und nach Bewohnerkontakt. • Nach Kontakt mit der unmittelbaren Wohnumgebung. • Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material. • Vor aseptischen Arbeiten (wie z. B. Vorbereitung von Medikamenten und Infusionen). • Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. 	ASEPTOMAN® MED _____ _____	30 Sekunden _____ _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Fläche	Spender Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Routine mind. 1x wöchentlich. • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ _____ OPTISAL® N _____ _____	3 Minuten 5 Minuten _____ _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____ _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____ ¹
	Spender Innenaufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Entsprechend den Angaben im Hygienehandbuch. 	_____	_____	Herstellerangaben beachten.	Mitarbeitende in der Pflege _____
	Medizin./techn. Geräte z. B. Stethoskop, Ohroliven, Fieberthermometer, Blutdruckmanschetten	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort nach Gebrauch. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ _____ OPTISAL® N _____ _____	3 Minuten 5 Minuten _____ _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____ _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____ ¹
	Bewohnernahe Flächen z. B. Bettgestell, Nachtisch, Tische, Matratzenschutzbezug	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. • Bei Bewohnerwechsel. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ² _____ _____ OPTISAL® N _____ _____	3 Minuten 5 Minuten _____ _____ 0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten _____ _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____ ¹

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.

Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

Fläche



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Häufige Kontaktflächen z. B. Tische, Stühle, Lichtschalter, Türgriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Täglich. • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Arbeitsflächen z. B. Flächen zum Stellen von Medikamenten	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Nutzung. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ³ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Inventar z. B. Schränke, Ablagen, Wandfliesen	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Lagerungshilfen	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. • Bei Bewohnerwechsel. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

² Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

³ Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.

⁴ Anwendungen auf kleinen Flächen.

Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

Fläche



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Rollstühle, Gehwagen, Toilettenstühle	<ul style="list-style-type: none"> • Bewohnerbezogen: Wöchentlich. • Direkt bei Kontamination. • Nicht Bewohnerbezogen: Sofort nach Gebrauch. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ⁴ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Waschbecken und Armaturen Spülbecken	<ul style="list-style-type: none"> • Direkt bei Kontamination. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ⁴ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Dusche, Badewanne, Duschstuhl, Lifter	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort nach Gebrauch. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ⁴ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Wasser abspülen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Waschschüsseln, Fußwannen	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort nach Gebrauch. 	DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) ⁴ ULTRASOL OXY® (WIPES) ²	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung gründlich mit Wasser abspülen.	Mitarbeitende in der Pflege ¹
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Steckbecken, Urinflaschen	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort nach Gebrauch. 			Chemothermische Aufbereitung/Thermische Aufbereitung. Angaben der Gerätehersteller beachten.	Mitarbeitende in der Pflege ¹

¹ Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen.

Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

² Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.

⁴ Fläche vor der Desinfektion trocknen.

Desinfektionsplan Wohn- und Pflegebereich

Sonstiges

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Sonstiges	Geschirr	• Sofort nach Gebrauch.			Geschirr unverzüglich zur Spülmaschine transportieren. Routinemäßig reinigen (bevorzugt maschinell bei mind. 65°C).	Mitarbeitende in der Pflege ¹ _____ _____
	Schutzkleidung	<ul style="list-style-type: none"> • Geeigneter Schutzkittel (DIN EN 14126) mit gut abschließendem Bündchen, flüssigkeitsdicht und strapazierfähig, die Körpervorderseite des Trägers bedeckend, wenn mit Kontamination, Durchfeuchtung der Arme und Arbeitskleidung zu rechnen ist. Ggf. zusätzlich flüssigkeitsdichte Schutzschürze. • Einmalhandschuhe: Bei möglichem Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material, Gegenständen, Geräten, Instrumenten. • Mund-Nasen-Schutz: Bei möglichem Kontakt mit Aerosolen, zum Schutz vor der Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen. 			Schutzkleidung über die Dienstkleidung/Arbeitskleidung anziehen. Nach Nutzung in Wäschetransportbehältern/-säcken sammeln und der Wäscheaufbereitung zuführen. Einmal-schutzkleidung wird dem Abfall zugeführt.	Alle Mitarbeitende _____ _____

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in **ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC** und **ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM** eingesetzt werden.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Einsatz von DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachbehandelt werden (Ausnahme: DESCOSEPT SENSITIVE (WIPES)). Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift